

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

ABRICORT CREAM 0,025% cream
АБРИКОРТ КРЕМ 0,025% крем
Флуоцинолонов ацетонид



ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ЛИСТОВКА ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОЗИ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

- *Запазете тази листовка! Може да се наложи да я прочетете отново.*
- *Ако у Вас възникнат допълнителни въпроси, моля обърнете се към Вашия лекуващ лекар или към фармацевт!*
- *Този продукт е предписан лично за Вас и не трябва да се дава на друг! Той може да навреди на други хора, дори ако те имат подобни на Вашите оплаквания.*

В ТАЗИ ЛИСТОВКА СЕ СЪДЪРЖА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

- 1. Какво представлява Абрикорт® крем и за какво се прилага**
- 2. Какво е необходимо да знаете преди приложението на Абрикорт® крем**
- 3. Как се прилага Абрикорт® крем**
- 4. Възможни нежелани реакции**
- 5. Условия на съхранение**
- 6. Допълнителна информация**

Абрикорт® крем

Лекарствено вещество в 1g дермален крем: Флуоцинолонов ацетонид 0.25mg,
Помощни вещества: цетилов алкохол ; ксалифин 15; глицерол; пропиленгликол;
лимонена киселина, монохидрат; метил парахидроксибензоат; пропил
парахидроксибензоат; пречистена вода.

Абрикорт® крем 15 g в двойно лакирани алуминиеви туби

Притежател на разрешението за употреба

Актавис ЕАД

ул."Атанас Дуков " 29

1407, Соф

Тел. ++359 2 9321762; ++359 2 9321771


Производител

"Балканфарма-Разград" АД

бул."Априлско въстание" №68

Разград-7200

Тел. 084613318



1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АБРИКОРТ КРЕМ И ЗА КАКВО СЕ ПРИЛАГА

Абрикорт крем съдържа флуоцинолон, синтетичен кортикостероид с противовъзпалителен и антиалергичен ефект.

Абрикорт крем се прилага за лечение на локални неинфектирани дерматози и възпаления, придружени от сърбеж и алергични промени по кожата като:

- Дерматити (контактен, атопичен, инсектен);
- Екземи (алергична контактна);
- Еритема мултиформе;
- Лупус еритематозус;
- Псориазис вулгарис;
- Лихен рубер планус.

2. КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ЗА ЗАПОЧНЕТЕ ЛЕЧЕНИЕТО С АБРИКОРТ КРЕМ

Абрикорт крем не се прилага при:

- лица с доказана в миналото свръхчувствителност към някои от компонентите на продукта;
- морбили, варицела, рубеола, други вирусни кожни заболявания, гъбични заболявания;
- акне вулгарис, розацея и периорален дерматит.

При приложението на този лекарствен продукт имайте предвид следното:

Не се препоръчва продължителна употреба на продукта над 2 седмици. При продължително лечение нараства рискът от развитие на нежеланите реакции и системни ефекти. При деца резорбцията е по-голяма, затова те са изложени на по-голям риск от поява на системните ефекти на кортикостероидите.


При развитие на инфекция на засегнатото място се прилагат подходящи антибактериални и антимикотични средства. Ако инфекцията продължава лечението с продукта се прекратява.

Прилагането на продукта върху клепачите трябва да става с повишено внимание поради опасност от изостряне симптомите на съществуващи катаракта и глаукома.

Прилага се с повишено внимание при пациенти със съществуваща кожна атрофия.

Ако се използват оклузивни превръзки или се третират големи участъци от кожата съществува опасност от увеличаване на системната резорбция на препарата и засилване на системните му ефекти.

Приложение на Абрикорт крем и прием на храни и напитки
Абрикорт крем е продукт за локално приложение.



Бременност

Преди прием на каквито и да е лекарствени продукти се консултирайте с лекуващия Ви лекар или с фармацевт

При бременност и кърмене да се избягва прилагането на продукта, особено продължително време, в големи количества и върху обширни повърхности.

Кърмене

Преди прием на каквито и да е лекарствени продукти се консултирайте с лекуващия Ви лекар или с фармацевт

При бременност и кърмене да се избягва прилагането на продукта, особено продължително време, в големи количества и върху обширни повърхности.

Шофиране и работа с машини

Абрикорт крем не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Приемане на други лекарства

Моля, информирайте своя лекуващ лекар или фармацевт ако приемате или сте приемали скоро други лекарствени продукти, дори ако те не са Ви били предписани от лекар

Няма данни за установени лекарствени взаимодействия. Въпреки това по време на лечението пациентът не трябва да се ваксинира срещу варицела и други заболявания, особено ако продуктът се прилага на обширни площи.

Данни за помощните вещества

Съдържанието на парабени (метил и пропил парахидроксибензоат) в Абрикорт крем може да причини уртикария, контактен дерматит и много рядко бронхоспазъм.

3. КАК СЕ ПРИЛАГА АБРИКОРТ КРЕМ


Винаги прилагайте Абрикорт крем според инструкциите на лекуващия лекар!

Продуктът е предназначен за локална употреба.

Абрикорт крем се прилага като малко количество от продукта под формата на тънък филм се нанася върху засегнатия участък 1-2 пъти дневно, в зависимост от тежестта на заболяването. Окосмените части се обръсват, за да се осигури директен контакт с лезиите.

За лечение на псориазис или на трудно подаващи се на лечение дерматози могат да се използват и оклузивни превръзки. Те се сменят 3-4 пъти дневно или по-често, по преценка на лекаря. При проява на резистентност или допълнителна инфекция трябва да се прекрати използването на оклузивна превръзка и да се продължи лечението с подходящо антимикробно средство.

Не се препоръчва лечение, по-продължително от 2-3 седмици. Върху лицето продължителността на лечението е 1 седмица при случайна абсолютна необходимост.



Продуктът не се прилага при деца под 2 години, а при деца над 2 години се прилага с внимание един път дневно.

Ако сте приели по-голямо количество от лекарството:

При прием на по-висока доза от предписаната веднага се обърнете за помощ към лекар!

Наблюдаваните при предозиране симптоми съвпадат с описаните по-горе нежелани лекарствени реакции, особено при по-продължително лечение и при приложение върху големи площи.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всеки друг лекарствен продукт, Абрикорт крем може за предизвика нежелани лекарствени реакции

Възможна е появата на акне, предизвикана от стероиди пурпура, изтъняване на епидермиса и подкожната тъкан, изсушаване на кожата, нарушения на пигментацията, стрии, периорален дерматит, вторични инфекции.

Когато продуктът се прилага върху интертригинозна и флексорна повърхност или върху лицето, тези промени могат да се получат и за по-кратко време.

След прилагане върху клепачите може да се развие повишено очно налягане и перде на очите (глаукома и катаракта).

Понякога могат да се появят уртикария или други кожни обриви, както и влошаване на съществуващите лезии.

При продължително прилагане върху големи площи локалните кортикостероиди могат да се проникнат през кожата в достатъчни количества, за да се появят някои от нежеланите лекарствени реакции, характерни за системно приложените кортикостероиди.

Ако забележите каквито и да е нежелани реакции, които не са отразени в тази листовка, моля съобщете за това на лекуващия лекар или фармацевт.

5. УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

При температура под 25⁰С.

Да не се замразява!

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Срок на годност: 2 (две) години

След първоначално отваряне на опаковката, съдържанието да не се употребява повече от 28 дни !

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За всяко допълнителна информация относно този лекарствен продукт се обръщайте към местното представителство на Притежателя на разрешението за употреба.

Актавис ЕАД

ул. "Атанас Дуков " 29

1407, София България

Тел. ++359 2 9321762; ++359 2 9321771

Последна актуализация на текста – Ноември 2008 г.

