


ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА



Adexor®
Адексор®

Trimetazidine (DCI)

ИМЕ

Adexor® филмирани таблетки

СЪСТАВ

Всяка таблетка съдържа 20 мг trimetazidine dihydrochloride

Помощни вещества: Царевично нишесте, манитол, поливидон, магнезиев стеарат, талк, титанов оксид (E171), глицерол, жълто-портокалов лак FCF S (E110), черно-червен лак (E124), полиоксиетиленгликол 6000, хидроксипропилметилцелулоза.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Кутия от 60 филмирани таблетки

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EGIS PHARMACEUTICALS LTD.

Kereszturi ut 30-38.

BUDAPEST, HUNGARY

По лиценз на:

Les Laboratoires Servier Industrie

905, route de Saran

45520 Gidy

France

ФАРМАКО - ТЕРАПЕВТИЧЕН КЛАС

Други сърдечно-съдови антиангинозни препарати

(C01EB15: сърдечно-съдова система)

ТЕРАПЕВТИЧНИ ИНДИКАЦИИ

СТРИКТНО ИЗПЪЛНЯВАЙТЕ ПРЕДПИСАНИЕТО НА ВАШИЯ ЛЕКАР, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ УСЛОЖНЕНИЯ

- Превантивно лечение на епизоди на ангина пекторис
- Лечение на кохлео-вестибуларни промени от исхемичен произход, такива като световъртеж, шум в ушите, намален слух.



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Свръхчувствителност към лекарственото вещество или към някое от помощните вещества.

АКО ИМАТЕ НЯКАКВИ СЪМНЕНИЯ, КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ.

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

РЕДОВНО ТРЯБВА ДА ИНФОРМИРАТЕ ВАШИЯ ЛЕКАР, АКО ПРИЕМАТЕ НЯКАКВИ ДРУГИ МЕДИКАМЕНТИ.

БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ

Бременност

Изследвания върху животни не са показали тератогенен ефект, но поради липса на клинични данни, назначаването на препаратата по време на бременност трябва да се избягва.

Кърмене

Поради липса на данни за екскрецията на препаратата с кърмата, не се препоръчва кърмене по време на лечението.

ИНФОРМИРАЙТЕ ВАШИЯ ЛЕКАР, АКО СТЕ БРЕМЕННА, КЪРМИТЕ ИЛИ СЕ ОПИТВАТЕ ДА ЗАБРЕМЕНЕЕТЕ.

ЕФЕКТИ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ ИЛИ РАБОТА С МАШИНИ

До този момент не е установен ефект върху способността за шофиране или работа с машини.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ОЦВЕТТЕЛИ

Могат да причинят алергичен тип реакции, включително астма. Рискът от алергии е по-голям при алергични към аспирин пациенти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ГЛИЦЕРОЛ

Вреден при високи дози. Може да причини главоболие, стомашно дразнене, диария.

КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ТОВА ЛЕКАРСТВО

1) ДОЗИРОВКА

СТРИКТНО ИЗПЪЛНЯВАЙТЕ ПРЕДПИСАНИЕТО НА ВАШИЯ ЛЕКАР.

Обичайната доза е 3 таблетки дневно.

Таблетките трябва да се приемат 3 пъти дневно по време на хранене.



2) НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Перорален прием

3) ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО

ПРИ ВСИЧКИ СЛУЧАИ СТРИКТНО СПАЗВАЙТЕ ЛЕКАРСКОТО ПРЕДПИСАНИЕ.

4) ПРЕДОЗИРАНЕ

Информирайте Вашия лекар.

5) КАКВО ДА СЕ ПРАВИ В СЛУЧАЙ, ЧЕ СЕ ПРОПУСНАТ ЕДИН ИЛИ НЯКОЛКО ПРИЕМА

Продължете лечението както обикновено.

Не удвоявайте дозата, когато пропуснете един прием.

НЕЖЕЛАНИ ЕФЕКТИ

Рядко се наблюдават слаби гастро-интестинални смущения: гадене, повръщане.

СЪОБЩАВАЙТЕ НА ВАШИЯ ЛЕКАР ЗА ВСЕКИ НЕЖЕЛАН ЕФЕКТ, КОЙТО НЕ Е ОПИСАН В НАСТОЯЩАТА ЛИСТОВКА.

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява под 30°C.

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО, НЕДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА.

СРОК НА ГОДНОСТ

ТОВА ЛЕКАРСТВО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЕМА СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ, ПОСОЧЕН ЯСНО ВЪРХУ ВЪНШНАТА СТРАНА НА ОПАКОВКАТА.

ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ЛИСТОВКАТА ЗА ПАЦИЕНТА

10.10.2002

