

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

AMLODIPIN ALKALOID® 5 mg tablets

(amlodipine)

АМЛОДИПИН АЛКАЛОИД® 5 mg таблетки

(амлодипин)

AMLODIPIN ALKALOID® 10 mg tablets

(amlodipine)

АМЛОДИПИН АЛКАЛОИД® 10 mg таблетки

(амлодипин)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани ефекти, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Амлодипин Алкалоид и за какво се използва
2. Преди да приемете Амлодипин Алкалоид
3. Как да приемате Амлодипин Алкалоид
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Амлодипин Алкалоид
6. Допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	200 700 77/48
Разрешение №	11-18336-7, 18. 06. 2012
Одобрение №	/

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АМЛОДИПИН АЛКАЛОИД И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Амлодипин Алкалоид (амлодипин) е представител на група лекарства, наречени калциеви антагонисти. Амлодипин се използва за лечение на повишено кръвно налягане (хипертония) и на определен тип гръдна болка, позната като гръдна жаба (ангина пекторис, стенокардия), една рядка форма на която е ангината на Принцметал или вариант. При пациенти с високо кръвно налягане Амлодипин Алкалоид действа като отпуска кръвоносните съдове така, че кръвта преминава по-лесно през тях. При пациенти с гръдна жаба Амлодипин Алкалоид подобрява захранването с кръв на сърдечния мускул, който по този начин получава повече кислород и в резултат се предотвратява гръдната болка. Амлодипин Алкалоид не осигурява моментално облекчение на гръдната болка при стенокардия.



2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕ АМЛОДИПИН АЛКАЛОИД

Не приемайте Амлодипин Алкалоид

- ако сте алергични към Амлодипин Алкалоид или други калциеви антагонисти или пък към някои от помощните вещества в таблетката. Алергията може да се прояви със сърбеж, зачервяване на кожата и затруднено дишане.
- ако имате стеснение на аортната клапа на сърцето (аортна стеноза), нестабилна стенокардия или кардиогенен шок.
- ако сте бременна или кърмите

Обърнете специално внимание при употребата на Амлодипин Алкалоид

Ако отговорите с "ДА" на някой от следващите въпроси, съобщете го на Вашия лекар преди да започнете прием на амлодипин алкалоид.

- Току-що преживели ли сте сърдечен инфаркт или хипертонична криза?
- Страдате ли от чернодробно заболяване?
- Възрастта Ви под 18 години ли е?

Вашият лекар може да има съображения да настоява да приемате таблетките.

Прием на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате или наскоро се приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Съобщете на Вашия лекар, ако приемате силденафил поради усилването на хипотензивния ефект в комбинация с амлодипин.

Преди хирургична манипулация съобщете на Вашия лекар или зъболекар, че приемате амлодипин.

Прием на Амлодипин Алкалоид с храни и напитки

Амлодипин Алкалоид може да се приема със и без храна. Не увеличавайте приема на сок от грейпфрут по време на лечение с амлодипин.

Не употребявайте алкохол, докато приемате Амлодипин Алкалоид.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Ако мислите че сте бременна или планирате да забременеете, кажете на Вашия лекар преди да приемете Амлодипин Алкалоид.

Жените с детороден потенциал трябва да използват ефективна контрацепция.

Не трябва да приемате Амлодипин Алкалоид, ако кърмите.



Шофиране и работа с машини

Може да почувствате сънливост или замаяност. Не шофирайте, не работете с машини и не извършвайте дейности, изискващи концентрация на вниманието, докато не установите как Ви въздейства амлодипин. За да намалите риска от замаяване, не ставайте от леглото и не се изправяйте внезапно и бързо, особено ако сте в напреднала възраст.

Важна информация относно някои от съставките на Амлодипин Алкалоид

Амлодипин Алкалоид съдържа лактоза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ АМЛОДИПИН АЛКАЛОИД

Винаги приемайте Амлодипин Алкалоид точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Обичайната доза е 5 mg веднъж дневно. В последствие дозата може да се увеличи до 10 mg веднъж дневно в зависимост от индивидуалния отговор.

Най-добре е да приемате Амлодипин Алкалоид по едно и също време всеки ден с вода. Важно е да продължавате да приемате Амлодипин Алкалоид освен ако Вашият лекар не Ви посъветва друго.

Консултирайте се с Вашия лекуващ лекар или с педиатър относно употребата на това лекарство при деца. Необходимо е специално внимание.

Амлодипин Алкалоид не бива да се приема от деца (под 6-годишна възраст).

Ако сте приели повече от необходимата доза Амлодипин Алкалоид

Ако сте приели повече от необходимата доза, трябва веднага да се свържете с Вашия лекар. Симптомите на предозиране включват: силна замаяност, прилошаване, ускорена сърдечна дейност.

Ако сте пропуснали да вземете Амлодипин Алкалоид

Ако случайно сте пропуснали да вземете дневната си доза, продължете със следващата доза. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели употребата на Амлодипин Алкалоид

Не преустановявайте внезапно приема на амлодипин. Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт относно постепенното намаляване на дозата.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.



4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Амлодипин Алкалоид може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Най-честите са: главоболие, отоци (подуване на глезените), обриви, лесна уморяемост, гадене, зачервяване, замайване, подуване или болезненост на венците, сърцебиене (неравномерен или учестен пулс).

Следните ефекти са наблюдавани у някои пациенти, но връзката с лечението с амлодипин или с болестното състояние е неясна: сърдечна атака (инфаркт на миокарда), неравномерен сърдечен ритъм (аритмия) и болки в гръдния кош.

Всички лекарства могат да предизвикат алергични реакции. Сериозни алергични реакции са много редки и още по-рядко са животозастрашаващи. Всяко внезапно хриптене, затруднение в дишането, подуване на клепачите, лицето или устните, обрив или сърбеж (особено ако засяга цялото тяло) трябва веднага да бъде съобщено на лекаря.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани ефекти, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ АМЛОДИПИН АЛКАЛОИД

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Амлодипин Алкалоид след срока на годност, отбелязан върху опаковката (за отбелязване срока на годност са използвани съкращения). Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Амлодипин Алкалоид

- Активното вещество е амлодипин.

Всяка таблетка на Амлодипин Алкалоид 5 mg съдържа 5 mg амлодипин (като амлодипинов безилат 6.934 mg).

Всяка таблетка на Амлодипин Алкалоид 10 mg съдържа 10 mg амлодипин (като амлодипинов безилат 13.869 mg).

- Другите съставки са лактоза монохидрат; микрокристална, целулоза; магнезиев стеарат.



Как изглежда Амлодипин Алкалоид и какво съдържа опаковката

Амлодипин Алкалоид 5 mg таблетки

Кръгли, двойноизпъкнали, бели таблетки с делителна черта от едната страна. Таблетката може да бъде разделена на две равни половини.

Амлодипин Алкалоид 10 mg таблетки

Кръгли, двойноизпъкнали, бели таблетки с делителна черта от едната страна. Делителната черта е само за улесняване на счупването за по-лесно поглъщане, а не за разделяне на равни дози.

Амлодипин Алкалоид 5 mg таблетки са опаковани в PVC блистери и запечатани с алуминиево фолио по 10 таблетки във всеки блистер. Картонената кутия съдържа 30 таблетки (три блистера) и листовка за пациента.

Амлодипин Алкалоид 10 mg таблетки са опаковани в PVC блистери и запечатани с алуминиево фолио по 15 таблетки във всеки блистер. Картонената кутия съдържа съдържа 30 таблетки (2 блистера) и листовка за пациента.

Производител

ALKALOID-INT d.o.o.
Šlandrova ulica 4
1231 Ljubljana – Črnuče,
Словения

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с притежателя на разрешението за употреба.

Притежател на разрешението за употреба

АЛКАЛОИД ЕООД
ж.к. "Мотописта" 2,
ул. "Рикардо Вакарини" № 2, ет. 3, ап. 10
гр.София 1404, Р. България
тел. +359 2 80 81 081
факс: +359 2 95 89 367
e-mail: office@alkaloid.bg

Дата на последно одобрение на листовката

