

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ANERVINA oral drops, solution АНЕРВИНА капки перорални, разтвор

Прочетете внимателно цялата листовка тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт. Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново. Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт. Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите такива неописани в листовката, моля да уведомите вашия лекар или фармацевт.

ДОПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Reg. № 200 000 286	14. 01. 2011
Приложение № 11-11748	

В тази листовка ще намерите следната информация:

- 1. Какво представлява АНЕРВИНА и за какво се използва**
- 2. Преди да приемете АНЕРВИНА**
- 3. Как да приемате АНЕРВИНА**
- 4. Възможни нежелани лекарствени реакции**
- 5. Съхранение на АНЕРВИНА**
- 6. Допълнителна информация**

1. Какво представлява АНЕРВИНА и за какво се използва

АНЕРВИНА се предлага под формата на разтвор за перорално приложение. В 100 g АНЕРВИНА се съдържат следните активно действащи вещества – Тинктура валериана 20.0 g; натриев бромид 1.5 g; амониев бромид 2.0 g; калиев бромид 3.0 g. В състава са включени и следните помощни вещества - етанол и пречистена вода.

АНЕРВИНА представлява комбиниран лекарствен продукт със седативен (успокояващ) и слабо изразен сънотворен ефект. Ефектите се свързват с действието на всяка една от съставките поотделно и като цяло.

АНЕРВИНА се използва за симптоматично лечение на раздразнителност, тревожност, леки нарушения в съня, свързани с физическа и умствена преумора, невротични разстройства, особено в климактериума.

2. Преди да приемете АНЕРВИНА

Кога не трябва да се използва АНЕРВИНА?

АНЕРВИНА не бива да се използва при:

- свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта
- тежка чернодробна недостатъчност
- пациенти с потисната бъбречна функция
- бременност
- кърмене
- деца под 12 годишна възраст.



Специални предпазни мерки при употреба

С особено внимание АНЕРВИНА се използва при следните пациенти:

- обезводнени пациенти
- пациенти на бедна на натриев хлорид диета
- повищена телесна температура
- вертебрална атеросклероза
- органични мозъчни нарушения
- дебилни пациенти
- депресирани пациенти
- пациенти с неврологични заболявания
- пациенти с психически заболявания
- алкохолици

АНЕРВИНА съдържа етанол (до 49 на сто V/V или до 0.2 g на доза) поради което не се препоръчва за употреба от страдащи от чернодробни заболявания, алкохолизъм, епилепсия, мозъчни увреждания или заболявания.

Употреба по време на бременност и кърмене

АНЕРВИНА не бива да се приема по време на бременност и кърмене.

Активно действащите съставки на Анервина преминават през плацентата и се секретират с майчиното мляко.

Прием на АНЕРВИНА с други лекарства

Възможно е засилване на седацията и ЦНС депресия при едновременно приемане на Анервина и седативни- сънотворни (барбитурати иベンзодиазепини), опиоидни аналгетици, транквилизатори и алкохол (или етанол-съдържащи лекарства).

Анервина не бива да се приема едновременно с лекарства увреждащи черния дроб.

Може да промени действието на някои лекарства.

Шофиране и при работа с машини

Анервина може да повлияе способността за шофиране и работа с машини. Съществува опасност от намаляване на активното внимание и забавяне на реакциите.

3. Как да приемате АНЕРВИНА

Възрастни: По 20-30 капки 1 - 2 пъти дневно, разтворени в малко вода или на бучка захар.

Деца: Деца над 12 години – 1 път дневно по толкова капки, на колкото години е детето.

Продължителност на приема: Анервина не бива да се използва повече от 15 дни без лекарско предписание.

Ако сте приели повече от необходимата доза

При приемане на високи дози (превишаващи многократно препоръчваните) могат да се наблюдават следните симптоми на предозиране: гадене и повръщане, абдоминална болка, констипация; главоболие, световъртеж, замаяност, депресия, халюцинации, отпадналост, лесна уморяемост, повишиване съсирваемостта на кръвта, хипотония, тахикардия, респираторен дистрес, стягане в гръден крак, нарушен зрение, мидриаза, абдоминална болка, трепор на крайниците, потискане на интестиналния мотилитет и тонус.



Симптомите на предозиране с бромиди най-често са следните: депресия, кома, хипотония, тахикардия и респираторен дистрес. В такъв случай потърсете лекарска помощ.

Няма специфичен антидот при предозиране на бромиди. Основната терапия е спиране приема на бромиди, измерване на серумните нива, агресивна хидратация и повишаване на уринарната бромидна екскреция. Тази терапия трябва да продължи до достигане на бромидни нива от по-малко от 100 - 150 mg/dL.

Симптомите на предозиране с валериана най-често са следните: лесна уморяемост, стягане в гръденния кош, хипотония, мидриаза, абдоминална болка, трепор на крайниците, замаяност. При прием на високи дози валериана се наблюдават потискане на интестиналния мотилитет и тонус.

При предозиране с валериана, лечението е симптоматично: прилага се стомашен лаваж с активен въглен и се проследяват основните жизнени показатели, чернодробните параметри и ЕКГ при симптоматични пациенти.

Ако сте пропуснали да приемете АНЕРВИНА

Ако пропуснете да приемете една доза, вземете я колкото е възможно по-скоро.

Ако почти е настъпило време за следващата доза, забравете за пропуснатата и продължете по обичайния режим на приемане. Никога не взимайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата.

Ако имате допълнителни въпроси, свързани с употребата на този лекарствен продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани лекарствени реакции

Както всички лекарства, така и Анервина може да предизвика нежелани реакции, въпреки, че не всеки ги получава.

Рядко при продължителна употреба във високи дози да се наблюдават следните нежелани реакции :

- От страна на гастро-интестиналния тракт: гадене и повръщане, дразнене на стомаха, абдоминална болка, констипация; чернодробни увреждания.
- От страна на централната нервна система: главоболие, възбуда, сънливост и понижена работоспособност; атаксия; вертиго (световъртеж); обърканост; мания; халюцинации; неврологични промени; повищено интраспинално налягане.
- От страна на дихателната система: респираторен дистрес синдром.
- От страна на кожата: прояви на свръхчувствителност и обриви.
- Зрителни нарушения: зениците могат да бъдат свити или разширени и може да има забавена реактивност към светлина. Много рядко може да се наблюдава нарушен виждане, следствие на ретробулбарен неврит.
- Сърдечно съдови нарушения: тахикардия (учестен пулс), рядко – хипотония.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. Съхранение на АНЕРВИНА

Да се съхранява в оригиналната опаковка при температура до 25°C, на сухо и защитено от светлина място, недостъпно за погледа и досега на деца!

Срок на съхранение след първоначално отваряне на опаковката – 40 дни.



Лекарството не трябва да се използва след датата на изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност включва последния ден от посочения месец.

Запалим продукт!

6. Допълнителна информация

АНЕРВИНА се предлага под формата на разтвор за перорално приложение в Тъмни стъклени бутилки с вместимост 50 ml, с полиетиленови капачки на винт и запушалка-капкомер.

Бутилки от полиетилентерефталат с вместимост 50 ml, с полиетиленови капачки на винт и запушалка капкомер.

Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба
“Химакс Фарма” ЕООД, 1618 София, ул. “Горица” 8 А.

Дата на последна актуализация на текста
Декември, 2010 г.

