

Version 7.2, 10/2006
Rev.1 07/2008

Б. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

АКНЕРИН 3 g/100 ml дермален разтвор
ACNERIN 3 g/100 ml cutaneous solution
Еритромицин

Допълнителна информация
Листовка - Приложение 2
КБМ РУ №: 11-3778 / 11.12.08
Одобрено: 26 / 11.11.08

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да прилагате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Акнерин и за какво се използва
2. Преди да използвате Акнерин
3. Как да използвате Акнерин
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Акнерин
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АКНЕРИН И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Акнерин съдържа активно вещество еритромицин, което се отнася към групата на антибиотиците. При приложение върху кожата потиска растежа на бактериите, които предизвикват инфекцията при акне (младежки пъпки).

Акнерин се прилага за локално лечение на акне вулгарис.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ АКНЕРИН

Не използвайте Акнерин


- ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното вещество еритромицин, други антибиотици от тази група или към някоя от останалите съставки на Акнерин;
- ако имате заболяване на кожата причинено от гъбички (повърхностни или дълбоки дерматомикози).

Обърнете специално внимание при употребата на Акнерин

- ако след 6 седмично лечение не настъпи подобрене, тъй като в този случай е възможно микробите, причинили акнето да са нечувствителни към лекарственото вещество или да са развили устойчивост към него. Възможно е лекуващият лекар да Ви предпише друго лекарство.

Прием на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.



Поради възможни неблагоприятни взаимодействия с други лекарства, не прилагайте Акнерин едновременно с лекарства или козметични продукти, които съдържат резорцинол, салицилов спирт, сяра, други вещества с изсушаващо действие.

Можете да използвате Акнерин едновременно с кератолитични (предизвикващи лющене на кожата) продукти и витамини, но избягвайте нанасянето им върху кожата по едно и също време.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

При локално приложение на еритромицин няма данни за преминаването му в системното кръвообращение на майката и плода, или за отделянето му в кърмата. Въпреки това, ако сте бременна или кърмите, използвайте Акнерин само след консултация с лекар.

Шофиране и работа с машини

Няма данни за неблагоприятно влияние на Акнерин върху активното внимание и реакциите.

Важна информация относно някои от съставките на Акнерин

В състава на продукта като помощно вещество се съдържа пропиленгликол. Може да причини дразнене на кожата.

3. КАК ДА ПРИЛАГАТЕ АКНЕРИН

Винаги прилагайте Акнерин точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Акнерин дермален разтвор е лекарство, което се прилага върху кожата. Не прилагайте лекарството върху открити рани и лигавици, в окото или устата!

Поразените участъци се намазват с разтвора с помощта на памучен тампон 2 пъти дневно сутрин и вечер, след предварително почистване на кожата. Предварително се санират наличните комедони и гноини колекции.

Възможно е подобрение да се появи след 3-4 седмично лечение.

Ако след 6-8 седмично лечение не се наблюдава подобрение, обърнете се към лекуващия лекар.

Ако сте пропуснали да използвате Акнерин

Ако сте пропуснали да приложите една доза, нанесете лекарството както обикновено. Не прилагайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата. Продължете да прилагате лекарството, както Ви е предписано.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Акнерин може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

По време на лечението с Акнерин е възможно, макар и рядко, да се наблюдават кожни реакции на свръхчувствителност, проявяващи се със зачервяване, сърбеж и обрив, понякога десквамация. В тези случаи приложението на продукта се преустановява.



Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ АКНЕРИН

Съхранявайте в оригиналната опаковка, на защитено от светлина място, при температура под 25°C!

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Акнерин след срока на годност отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Можете да използвате това лекарство до 1 месец след отваряне на бутилката.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Акнерин

- Активното вещество е: еритромицин 3 mg в 1 ml дермален разтвор.
- Другите съставки са: пропиленгликол, етанол 96%.

Как изглежда Акнерин и какво съдържа опаковката

Бистра, безцветна течност в пластмасова, непрозрачна, бяла бутилка с дозиращо устройство. Бутилката е поставена в картонена кутия, заедно с листовка.

Притежател на разрешението за употреба и производител

УНИФАРМ АД, България
1797 София, ул. "Тр. Станоев" №3

Дата на последно одобрение на листовката - ноември 2008.

