

## ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Алерцит 5 mg филмирани таблетки  
Левоецетиризинов дихидрохлорид

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

## В тази листовка:

1. Какво представлява Алерцит и за какво се използва
2. Преди да приемете Алерцит
3. Как да приемате Алерцит
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Алерцит
6. Допълнителна информация

## 1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АЛЕРЦИТ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Алерцит е вид лекарство, наречено неседативен антихистамин. Използва се за лечение на симптоми на алергична реакция, като например:

- алергичен ринит (включително персистиращ алергичен ринит);
- сърбящ обрив (подобен на копривна треска), който трае дълго време (хронична идиопатична уртикария).

## 2. ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ АЛЕРЦИТ

## Не използвайте Алерцит

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към левоецетиризинов дихидрохлорид или към някой друг антихистамин или към някоя от останалите съставки на Алерцит (виж „Какво съдържа Алерцит“)
- ако имате увредена бъбречна функция (тежка бъбречна недостатъчност с креатининов клирънс под 10 ml/min)
- ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари. В този случай, преди да започнете да използвате този лекарствен продукт, се консултирайте с Вашия лекар.

## Обърнете специално внимание при употребата на Алерцит

Използването на Алерцит не се препоръчва при кърмачета и малки деца под 2 години. Не се препоръчва употребата на Алерцит при деца на възраст под 6 години, тъй като предлаганите филмирани таблетки не позволяват подходящо адаптиране на дозата.

## Прием на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

### **Прием на Алерцит с храна и напитки**

Алерцит трябва да се приема с чаша вода. Може да се приема със или без храна.

Необходимо е внимание при едновременната употреба на Алерцит и алкохол, тъй като въздействието на алкохола може да се повиши.

### **Бременност и кърмене**

Обърнете се за съвет към Вашия лекар или фармацевт преди да вземете който и да е лекарствен продукт.

Уведомете Вашия лекар ако сте бременна, опитвате се да забременеете или кърмите.

### **Шофиране и работа с машини**

По време на лечението с Алерцит някои пациенти могат да почувстват сънливост, умора и изтощение. Ако възнамерявате да шофирате, да извършвате потенциално опасни дейности или да работите с машини, трябва да изчакате докато установите как Ви въздейства лекарството. Направените проучвания не показват нарушение на вниманието, реакциите и способността за шофиране при здрави хора, след употребата на левоцетиризин в препоръчаната доза.

### **Важна информация относно някои от съставките на Алерцит**

Тези таблетки съдържат лактоза. Ако Вашият лекарят Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него преди да започнете да използвате този лекарствен продукт.

## **3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ АЛЕРЦИТ**

Винаги приемайте Алерцит точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Обичайната доза за възрастни и деца на 6 и повече години е една таблетка дневно (5 mg).

На пациенти с увредена бъбречна функция може да бъде предписана по-ниска доза в съответствие с тежестта на бъбречното заболяване.

Ако имате само нарушена чернодробна функция може да вземате обичайната предписвана доза.

Ако имате увредени едновременно чернодробна и бъбречна функции може да Ви бъде предписана по-ниска доза в зависимост от тежестта на бъбречното заболяване.

При деца дозата трябва да бъде съобразена и с телесното тегло; дозировката ще бъде определена от Вашия лекар.

Алерцит не се препоръчва при бебета и малки деца под 2 годишна възраст.

**Алерцит 5 mg филмирани таблетки** не се препоръчва при деца на възраст под 6 години (виж точка 2, „Обърнете специално внимание при употребата на Алерцит”). За деца на възраст под 6 години е на разположение друга, подходяща лекарствена форма. Моля, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Възрастни и деца на възраст 6 и повече години трябва да поглъщат таблетките с вода.

### **Ако сте приели повече от необходимата доза Алерцит**

Значително предозиране може да предизвика сънливост при възрастни. При деца, първоначално може да се прояви възбуда и безпокойство, последвани от сънливост.

Ако мислите, че сте приели повече от необходимата доза Алерцит, моля уведомете Вашия лекар, които ще реши какви действия трябва да се предприемат.

#### **Ако сте забравили да вземете Алерцит**

Ако сте забравили да вземете Алерцит, или сте взели доза, по-малка от предписаната от Вашия лекар, не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата; изчакайте времето за следващата доза и вземете обичайната доза, предписана Ви от лекаря.

#### **Ако сте спрели приема на Алецит**

Спирането на лечението с Алерцит по-рано, отколкото Ви е предписано, не би трябвало да доведе до вредни последици, обаче Вашето заболяване може да се прояви отново.

Ако имате допълнителни въпроси относно употребата на този продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

### **4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

Както всички лекарства и Алерцит може да предизвика нежелани лекарствени реакции, въпреки че не се проявяват при всички.

*Чести нежелани реакции (появяват се при 1 до 10 от 100 пациента)*

- сухота в устата
- главоболие
- умора
- сънливост

*Нечести нежелани реакции (появяват се при 1 до 10 от 1000 пациенти)*

- отпадналост
- коремна болка

*Много редки нежелани реакции (появяват се при по-малко от 1 от 10 000 пациента)*

- реакции на свръхчувствителност (симптомите могат да включват: подуване на устата, лицето и/или гърлото или затруднено преглъщане съпроводено с хриптене, затруднено дишане, внезапно рязко спадане на кръвното налягане, водещо да колапс или шок, които може да са фатални). При първите признаци на реакция на свръхчувствителност, спрете приема на Алерцит и незабавно се вижте с Вашия лекар.
- палпитации
- гърчове
- зрителни нарушения (като замъглено виждане)
- оток (задържане на вода, предизвикващо подуване)
- пруритус (сърбеж)
- обрив и уртикария (подуване или обрив, зачервяване и сърбеж по кожата)
- затруднено дишане
- повишаване на теллото
- мускулна болка
- агресивно или дразнещо поведение
- хепатит или чернодробни проблеми (пожълтяване на кожата или бялото на очите)
- гадане

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

### **5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ АЛЕРЦИТ**

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Алерцит след срока на годност отбелязан върху блистера и картонената опаковка след „Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

## **6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

### **Какво съдържа Алерцит**

- Активното вещество е левоцетиризинов дихидрохлорид.  
Всяка филмирана таблетка съдържа 5 mg левоцетиризинов дихидрохлорид.
- Другите съставки са микрокристална целулоза, лактоза монохидрат, безводен колоиден силициев диоксид, магнезиев стеарат, хиромелоза (E464), титанов диоксид (E171) и макрогол 400.

### **Как изглежда Алерцит и какво съдържа опаковката**

Филмираните таблетки от 5 mg са бели, овални, с щамповано „G” делителна черта „G” от едната страна и гладка друга страна. Таблетката може да бъде разделена на две еднакви половини.

Таблетките са опаковани в алуминий/алуминиеви блистери или PVC/PVdC-алуминиеви блистери.

*Съдържание на 1 опаковка*

7, 10, 14, 28, 30, 50 или 90 филмирани таблетки

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

### **Притежател на разрешението за употреба**

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o  
Hvězdova 1716/2b  
140 78 Praha 4  
Чешка Република

### **Производители**

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o  
Hvězdova 1716/2b  
140 78 Praha 4  
Чешка Република

Tillomed Laboratories Ltd.  
3 Howard Road  
Easton Socon, St. Neots, Cambridgeshire, PE 198ET  
Великобритания

Glenmark Generics (Europe) Limited  
The Old Saw Mill, Hatfield Park,  
Hatfield, Hertfordshire, AL9 5PG  
Великобритания

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в държавите-членки на ЕЕА под следните имена:

Португалия	Levecetirizina Glenmark 5 mg
Чешка Република	Silardex 5 mg potahované tablety
Естония	Cetizal 5 mg
Унгария	Cetizal 5 mg
Литва	Cetizal 5mg plėvėle dengtos tabletės
Латвия	Cetizal 5mg apvalkotās tablete
Полша	Cetizal
Румъния	Cetizal 5mg comprimate filmate
Словашка Република	Cetizal 5 mg
Словения	Zenzil 5mg filmsko obložene tablete

Дата на последно одобрение на листовката