



ДОПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
К-М Рег. №	20100261
Разрешение №	П - 9385 / 19.04.2010
Прообраз №	/

**ANTHERPIN® 5% cream – 5, 10, 20 g**

**ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ**  
**АНТИХЕРПИН® 5% крем**  
**ANTHERPIN® 5% cream**  
**ацикловир (aciclovir)**

**Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай, че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след първите 5 дни от лечението.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

**В тази листовка:**

1. Какво представлява Антихерпин крем и за какво се използва
2. Преди да използвате Антихерпин
3. Как да използвате Антихерпин
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Антихерпин
6. Допълнителна информация


**1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АНТИХЕРПИН КРЕМ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА**

Антихерпин крем съдържа активното вещество ацикловир, принадлежащо към група противовирусни лекарствени продукти.

Антихерпин се предписва за лечение на начални и рецидивиращи лабиални (на устата), генитални и кожни инфекции, причинени от вирус Herpes simplex.

Вашият лекар преценява, дали този лекарствен продукт е подходящ за Вас и за лечение на Вашето състояние.

**Запомнете: Херпесът е заразно заболяване, което се предава чрез контакт със засегнатото място! Вирусът може да засегне и други части на тялото. Винаги измивайте ръцете си след контакт с херпеса. Не разранявайте херпеса. Не позволявайте на други да използват Вашите тоалетни принадлежности –**





### ANTHERPIN® 5% cream – 5, 10, 20 g

прибори, кърпи и т.н. Не пипайте очите си след като сте докосвали херпеса – това може да предизвика заразяване и разязвяване на роговицата. Избягвайте да се целувате по време на клиничната изява на херпеса.

## **2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ АНТИХЕРПИН**

### **Не използвайте Антихерпин**

- Ако сте алергични към активното вещество ацикловир, към пропилен гликол или някоя от другите съставки на Антихерпин крем.
- Ако сте алергични към някой друг антивирусен продукт, напр. валацикловир.

### **Обърнете специално внимание при употребата на Антихерпин**

Информирайте Вашия лекар/фармацевт, ако сте под лекарско наблюдение поради потискане на имунитета (след костномозъчна трансплантация, СПИН и др.).

### **Употреба на други лекарства**

Не са наблюдавани значими лекарствени взаимодействия при едновременно приложение на ацикловир с други лекарства. Независимо от това, уведомете лекаря/фармацевта си за всички други лекарствени продукти, които използвате или наскоро сте използвали, включително и такива, отпускани без рецепта.

### **Бременност и кърмене**

Бременност – липсват данни за безопасността от приложение на Антихерпин по време на бременност. В тези случаи употребата му се препоръчва само ако очакваните резултати от лечението превъзхождат възможния риск за плода.

Кърмене – активната съставка ацикловир не се отделя в майчината кърма при локално кожно приложение поради минималната резорбция. Наблюдавано е отделяне в кърмата, когато ацикловир се прилага през устата, което налага преустановяване на кърменето.

### **Шофиране и работа с машини**

Лекарственият продукт няма седативен ефект и не повлиява изпълнението на действия, изискващи активно внимание.


### **Предозиране**

Не са наблюдавани случаи на предозиране при локално приложение.

### **Ако пропуснете поредното приложение на лекарството**

Продължете да прилагате крема по определената схема.

### **Важна информация относно някои от съставките на Антихерпин**





### **ANTIHERPIN® 5% cream – 5, 10, 20 g**

Антихерпин крем съдържа помощното вещество пропилен гликол, което може да предизвика кожно дразнене.

### **3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ АНТИХЕРПИН**

Ако Вашият лекар не е предписал друго, следвайте следните инструкции:

- Измийте добре ръцете си преди и след нанасяне на крема, за да избегнете влошаване на състоянието или предаване на инфекцията на друго място или на друг човек.
- Намажете равномерно засегнатото място. Кремът се нанася както върху вече развит херпес, така и върху участъците, където се предполага тяхната поява.
- Прилагайте Антихерпин крем 5 пъти дневно. Не е необходимо прилагане през нощта.
- Прилагайте лекарството в продължение на 5 дни. Ако кожните промени не са изчезнали, можете да продължите лечението с Антихерпин крем още 5 дни. Ако Вашето състояние не се подобри след този срок, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.
- Не превишавайте препоръчаната доза.
- Прилагайте лекарството *само върху кожни* изменения.
- Не прилагайте крема в очите, устната кухина и влагалището. Това може да доведе до поява на нежелани реакции.
- Не смесвайте Антихерпин крем с други кремове и лосиони.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

### **4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

Както всички лекарства, Антихерпин може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.


При някои пациенти може да се появят алергични реакции към лекарствения продукт. Те се изразяват в появата на сърбящ и червен обрив на мястото на приложение. Ако това се случи, прекратете приложението на лекарството и уведомете Вашия лекар.

Уведомете Вашия лекар, ако някоя от следните нежелани реакции се появи при Вас: тръпнене или леко затопляне след първото намазване; изсушаване и напукване на кожата; лек сърбеж и зачервяване на мястото на приложение.

Информирайте Вашия лекар при появата на тези или други нежелани лекарствени реакции, споменати в листовката.

### **5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ АНТИХЕРПИН**

В оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.





### ANTIHERPIN® 5% cream – 5, 10, 20 g

Да се съхранява под 25°C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Антихерпин след срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Срок на годност след отваряне на тубата: 1 месец.

## **6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

### **Какво съдържа Антихерпин крем**

Активната съставка е ацикловир 50 mg .в 1 g крем.

- в туба от 5 g се съдържа 250 mg ацикловир.
- в туба от 10 g се съдържа 500 mg ацикловир.
- в туба от 20 g се съдържа 1000 mg ацикловир.

Другите съставки са: пропилен гликол; полоксамер 407; цетостеарилов алкохол; глицерил стеарат/ПЕГ 100 стеарат; течен парафин; бял вазелин; натриев лаурил сулфат; пречистена вода.

### **Как изглежда Антихерпин и какво съдържа опаковката**

Хомогенна кремообразна маса с бял цвят, без мирис.

Крем по 5, 10 и 20 g в мембранни алуминиеви туби, по 1 туба в картонена кутия, заедно с листовка.

### **Притежател на разрешението за употреба и производител**

СОФАРМА АД

ул. Илиенско шосе 16, 1220 София, България

Дата на последно одобрение на листовката: 17.03.2008 г.

