

**ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕН ЗА ПО ЛЕКАРСТВАТА**

**АНТИСТАКС 180 mg капсули**  
**ANTISTAX® 180 mg capsules**

Сух екстракт от листа на червена лоза (4-6:1; Екстрахиращ агент: вода)

Детайли - Приложение 2

Идентификационен №	32060752
Издателство №	14229, 02.08.2011
Сериен №	

**Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.**

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

**В тази листовка:**

1. Какво представлява АНТИСТАКС и за какво се използва
2. Преди да приемете АНТИСТАКС
3. Как да приемате АНТИСТАКС
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате АНТИСТАКС
6. Допълнителна информация

## 1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АНТИСТАКС И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Стандартизираният екстракт от листа на червена лоза, активната съставка на АНТИСТАКС, представлява сложна смес от различни класове съединения, които имат противовъзпалителна активност. Те предпазват кръвоносните съдове, намаляват преминаването на плазма или вода от клетката в съседните на кръвоносния съд тъкани, като по този начин предотвратяват появата или намаляват вече съществуващите отоци на долните крайници.

АНТИСТАКС се използва за профилактика и лечение на симптоми, указващи наличието на установена хронична венозна недостатъчност, свързана с разширени вени, включително оток на долните крайници, тежест или умора в краката, чувство на напрежение, изтръпване и болка.

## 2. Преди да приемете АНТИСТАКС

**Не приемайте АНТИСТАКС**

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към сух екстракт от листа на червена лоза или към някоя от другите съставки на АНТИСТАКС.
- ако имате рядко наследствено заболяване или състояние, което може да е несъвместимо с някои от помощните вещества на лекарствения продукт (моля, вижте точка "Важна информация относно някои от съставките на АНТИСТАКС").

**Обърнете специално внимание при употребата на ANTISTAX**

- при внезапна поява на оток, зачервяване на кожата, чувство на напрежение, горещина и болка, особено в единия крак, трябва да се консултирате с Вашия лекар, тъй като тези симптоми може да са признаци за няличие на тромбофлебит (възпаление на вена, причинено от съсирек). Това състояние не е следствие от лечението с екстракт от листа на червена лоза, като самото лечение може да бъде продължено.
- в случай на недостатъчен или незадоволителен симптоматичен отговор в рамките на 6 седмици, трябва да се консултирате с Вашия лекар, тъй като отокът може да има друга причина.

**Прием на други лекарства**

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Няма съобщения за взаимодействие с други лекарствени продукти.

**Бременност и кърмене**

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Няма опит относно употребата при бременни или кърмещи жени. Затова не се препоръчва употребата на АНТИСТАКС.

**Шофиране и работа с машини**

Не са провеждани проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини.

**Важна информация относно някои от съставките на АНТИСТАКС**

АНТИСТАКС 180 mg капсули съдържа 30 mg глюкоза за максимално препоръчаната дневна доза.

**3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ АНТИСТАКС**

Винаги приемайте АНТИСТАКС точно както Ви е каза Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Обичайната доза за възрастни е 2 капсули (360 mg дневно). Може да увеличите дозата до 4 капсули на ден, които трябва да се приемат сутрин. Капсулата трябва да се приема цяла, с малко вода, преди хранене.

**Ако сте приели повече от необходимата доза АНТИСТАКС**

Ако случайно сте приели повече от необходимата доза АНТИСТАКС, свържете се незабавно с Вашия лекар или фармацевт.

Въпреки, че има съобщения за единични случаи на предозиране, няма съобщения за сериозни събития по време на лечението с АНТИСТАКС.

**Ако сте пропуснали да приемете АНТИСТАКС**

Ако сте пропуснали да приемете една доза, вземете я веднага щом си спомните за това, но не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата. След това продължете приема по обичайния начин.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

#### 4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, АНТИСТАКС може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

За определяне на честотата на нежеланите реакции се използва следната класификация:

много чести:	засягащи повече от 1 пациент на 10;
чести:	засягащи повече от 1 на 100, но по-малко от 1 на 10 пациенти;
нечести:	засягащи повече от 1 на 1 000, но по-малко от 1 на 100 пациенти;
редки:	засягащи повече от 1 на 10 000; но по-малко от 1 на 1 000 пациенти
много редки:	засягащи по-малко от 1 на 10 000 пациенти
с незвестна честота:	от наличните данни не може да бъде направена оценка

##### *Стомашно-чревни нарушения*

Нечести: Гадене, стомашен дискомфорт и други симптоми, свързани с храносмилателната система

##### *Нарушения на кожата и подкожните тъкани*

Нечести: Сърбежен обрив, копривен обрив и други реакции на свръхчувствителност

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

#### 5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ АНТИСТАКС

Да се съхранява на места, недостъпни за деца.

Не използвайте АНТИСТАКС след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след "Годен до:"

Да се съхранява на сухо място под 25°C.

#### 6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа АНТИСТАКС

- Активното вещество е 180 mg сух екстракт от листа на червена лоза (4-6:1) (*Extractum Vitidis viniferae foliae aquosum siccum*; Екстрахиращ агент: вода) за капсула
- Другите съставки са:

Капсула: силиций колоиден безводен, магнезиев стеарат, царевично нишесте, талк, глюкоза течна, изсушена чрез разпрашване

Обвивка на капсулата: желатин, натриев лаурилсулфат, пречистена вода, титанов диоксид (E171), железен оксид червен (E 172), железен оксид жълт (E 172).

### **Как изглежда АНТИСТАКС и какво съдържа опаковката**

Блистери от PP/Al или Al/PVC/PVDC

Картонена опаковка, съдържащи 20, 50 или 100 капсули.

### **Притежател на разрешението за употреба и производител**

*Притежател на разрешението за употреба*

Boehringer Ingelheim International GmbH

D-55216 Ingelheim am Rhein

Германия

*Производител*

Ginsana S.A.

Via Mulini 6934

Bioggio, Швейцария

**Дата на актуализация на текста:**